

## 11 ¿Existe tratamiento para la fiebre amarilla?

No hay tratamiento específico para la fiebre amarilla pero la atención específica está dirigida a tratar la deshidratación, la insuficiencia hepática y renal, y la fiebre. Las medidas pueden mejorar el desenlace de los casos graves y están disponibles en todas las zonas del país.

## 12 ¿Qué medidas pueden implementarse para evitar que se críe el mosquito?

- No dejes agua estancada en materas ni floreros; cambia el agua cada 6 días.
- Mantén siempre tapados los recipientes donde almacenes agua.
- Lava cada 8 días albercas, canecas o pilas, aplicando limpiador por 10 minutos y restregando bien.
- Elimina objetos que puedan acumular agua como llantas, tapas, chatarra o basura.
- Limpia patios, canales y lotes baldíos para evitar criaderos.
- Participa en jornadas comunitarias de recolección de inservibles.

Actualización brote de fiebre amarilla a nivel nacional, 15 de julio de 2025. En el contexto del brote de fiebre amarilla que afecta al país, en el acumulado 2024-2025 se han confirmado **123 casos de fiebre amarilla y uno (1) de procedencia exterior**, con 53\*\* defunciones (acumuladas 2024-2025 preliminar), lo que **representa una letalidad acumulada preliminar del 43.09% (53/123)**.



| Día de atención                           |             | No hay atención                 |             |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| Centro de Salud Toledo Plaza              | L M M J V S | UMIST                           | L M M J V S |
| Calle 105 # 15D-28                        | L M M J V S | Carrera 21 No. 12-02            | L M M J V S |
| Centro Médico Bucaramanga EPS Sanitas     | L M M J V S | Cra. 32 #49-33                  | L M M J V S |
| Centro Médico Colsubsidio                 | L M M J V S | Cra. 29 # 41-37                 | L M M J V S |
| Clinica Materno Infantil San Luis         | L M M J V S | Cra. 26 #49-56                  | L M M J V S |
| Confirmed FPS                             | L M M J V S | Cra. 26A # 50-98                | L M M J V S |
| Coomultirasan FPS Sura                    | L M M J V S | Cra. 27 # 33-87                 | L M M J V S |
| Dispensario Médico Militar De Bucaramanga | L M M J V S | Avenida Quebrada Seca #33 A-207 | L M M J V S |
| FPS Forpresalud Bucaramanga               | L M M J V S | CALE 33 # 27-47                 | L M M J V S |
| FPS Sura Bucaramanga                      | L M M J V S | CL 52 #29-123                   | L M M J V S |
| Vitrey Solís Cabeceira                    | L M M J V S | Cra. 29 #47-56                  | L M M J V S |
| Fiscal Cabeceira                          | L M M J V S | Cra. 33N #49-35                 | L M M J V S |
| Hospital Universitario De Santander       | L M M J V S | Cra. 33 #29-126                 | L M M J V S |
| Hospital Universitario Los Comuneros      | L M M J V S | KRA.27 #30-15                   | L M M J V S |

|                               |             |                         |             |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Centro de Salud Toledo Plaza  | L M M J V S | Centro de Salud Ciudad  | L M M J V S |
| Calle 34 Norte No.8A-Bis-18   | L M M J V S | Carrera 6 # 25-50       | L M M J V S |
| Centro de Salud PJC           | L M M J V S | KM 2 Vía Café Madrid    | L M M J V S |
| Centro de Salud Kennedy       | L M M J V S | Calle 17 Carrera 12     | L M M J V S |
| Centro de Salud Colorados     | L M M J V S | KM 5 Vía al Mar         | L M M J V S |
| Centro de Salud Campo Hermoso | L M M J V S | Calle 45 Nro. 0 OCC-199 | L M M J V S |
| Centro de Salud Villaras      | L M M J V S | Carrera 11 Nro. 18B-50  | L M M J V S |
| Centro de Salud Libertad      | L M M J V S | Carrera 32 # 99-18      | L M M J V S |
| Centro de Salud Regaderos     | L M M J V S | Carrera 23C Nro. 1-04N  | L M M J V S |
| Centro de Salud Santander     | L M M J V S | Calle 27 Nro. 8 OCC-35  | L M M J V S |
| Centro de Salud La Joya       | L M M J V S | Calle 41 # 4-31         | L M M J V S |
| Centro de Salud Rosarito      | L M M J V S | Calle 34 Nro. 35-57     | L M M J V S |
| Centro de Salud Morrito       | L M M J V S | KM 1 Vía a Pamplona     | L M M J V S |
| Centro de Salud Muñis         | L M M J V S | Cra. 3 #5741            | L M M J V S |
| FPS CDI SAS                   | L M M J V S | Cra. 37 #52-126         | L M M J V S |

## ¿Dónde se puede aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla en Bucaramanga?

Lunes a viernes  
7:30 a.m. a 2:00 p.m.  
Sábado  
7:00 a.m. a 11:00 p.m.



# ABC de la Fiebre Amarilla en Bucaramanga

## 1 ¿Qué es la Fiebre amarilla?

Es una enfermedad infecciosa causada por un virus que se transmite a los seres humanos únicamente a través de la picadura de mosquitos infectados. Se le llama amarilla debido a la coloración que se presenta en la piel de las personas infectadas.

## 2

## ¿Cómo se transmite?

En zonas urbanas se transmite por mosquitos infectados del género Aedes (los mismos que transmiten el dengue) y en zonas selváticas por los mosquitos Haemagogus y Sabethes. Los mosquitos se infectan cuando pican a personas o monos infectados. La enfermedad no se transmite por contacto entre personas.



Secretaría de  
Salud y Ambiente



www.bucaramanga.gov.co



### 3 ¿Cuáles son los síntomas?

Una vez contraído, el virus de la fiebre amarilla se incuba en el cuerpo durante 3 a 6 días. Algunas personas no experimentan síntomas, pero lo más comunes son fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, pérdida de apetito, náuseas o vómitos; en la segunda fase de la enfermedad, las personas pueden desarrollar sangrado e ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos).

4

### ¿Cómo se previene la fiebre amarilla?

Según la OPS, la vacunación es la medida preventiva más eficaz contra esta enfermedad. **Es gratis, segura y es efectiva contra la enfermedad a partir del día 10 de su aplicación**, alcanzando una inmunidad del 99% al cabo de 30 días. Una sola dosis te protege toda la vida.

5

### ¿Quiénes deben vacunarse?

- Todas las personas entre los 9 meses y 60 años y más que vivan, transiten o visiten el Municipio de Bucaramanga.



- Los viajeros a zonas de alto riesgo mínimo 10 días antes del viaje.



### 6 ¿Cuáles son las zonas determinadas en el país como de alto riesgo?

El 100% de los municipios de los Departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Choco, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Putumayo, Tolima, Vaupés y Vichada.

En Santander: Barrancabermeja, Bolívar, **Bucaramanga**, Charalá, Cimitarra, Coromoro, El Playón, Floridablanca, Girón, Landáuri, Piedecuesta, Puerto Parra, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Socorro y Surata.



### 7 Si no recuerdo si me he vacunado, o no encuentro mi carné de vacunación ¿qué debo hacer?


**1era opción**  
Vacunarse, **previo diligenciamiento de la encuesta** para vacuna contra fiebre amarilla.

**2da opción**  
**Firmar disentimiento** de vacunación contra la fiebre amarilla en caso de no aceptación.

8

### ¿El mismo carné de vacunación blanco que brinda el PAI nacional, sirve como documento de certificación internacional para viajeros?

Si vas a viajar fuera del país, necesitas el carné internacional amarillo de fiebre amarilla. Puedes obtenerlo en la UIMIST (Cra. 21 #12-02, San Francisco) presentando copia de la cédula, tiquetes aéreos con fecha no mayor a un mes y el certificado de vacunación.



### 9 ¿Cuáles personas no deberían vacunarse?

- Personas con Cáncer, diabetes no controlada, SIDA, artritis reumatoidea, enfermedad del timo, (incluye timectomía), insuficiencia renal o crónica, psoriasis, enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, Miastenia gravis, tumor del timo o extirpación.
- La vacuna se pudiera administrar a pacientes infectados por VIH asintomáticos, previa autorización del médico tratante.
- Personas que consumen medicamentos como corticoides (uso continuo por mas de 14 días), quimioterapia, radioterapia, antirretrovirales
- Personas con problemas de coagulación como Púrpura trombocitopénica, lesiones hemorrágicas en piel (petequias o equimosis), hemofilia, enfermedad de Gilbert
- No se pueden vacunar embarazadas.
- Lactantes se pueden vacunar después de los 9 meses de haber dado a luz.

### ¿Si cuento con certificado de vacunación, pero no estoy registrado en el sistema nominal que debo hacer?

Presentar certificado de vacunación en el servicio de vacunación de las IPS y centros de salud para que sea actualizado en el sistema PAIWEB.

### ¿Cuál es el costo de la vacuna?

La vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita.

### ¿Cuántas dosis me debo aplicar?

Única dosis en la vida.

### 10 Si no me puedo vacunar, ¿Qué otras medidas de autocuidado debo tener?

En el caso de personas a quienes por motivos médicos no se deba administrar la vacuna y requieran viajar a un área endémica de fiebre amarilla, deben adoptar medidas de prevención como aplicarse repelente contra insectos cada 4 horas para evitar las picaduras de mosquitos, usar camisas con manga y pantalones largos, usar toldillos en la cama donde duermen, lo mismo que instalar anjeos en puertas y ventanas.